

AVALIAÇÃO CLÍNICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE IDOSOS RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO CASA DE REPOUSO DA CANTAREIRA - SÃO PAULO-SP (APOIO UNIP)

Aluna: Flavia Regina Macahiba Colloca

Orientador: Prof. Ricardo Salgado de Souza

Curso: Odontologia

Campus: Indianópolis

Dentre os países em desenvolvimento, o Brasil caminha cada vez mais para se tornar um país majoritariamente idoso. Essa mudança, associada ao aumento da longevidade, tem levado as pessoas a ver com mais naturalidade a decisão de um idoso de morar sozinho, provocando, desta forma, um aumento no número de idosos que residem em asilos. Sendo assim, este projeto tem como objetivo contribuir com os dados sobre a prevalência de alterações em cavidade bucal de uma amostra representativa de idosos residentes em uma instituição no Município de São Paulo-SP. Para tanto, foi realizado um estudo transversal em 26 idosos, entre 60 a 97 anos, de ambos os sexos, sendo coletadas, por meio de um questionário, informações referentes à idade, gênero, higienização bucal, uso de próteses, necessidade de nova prótese e hábitos nocivos. Em seguida, foi realizado o exame clínico bucal para diagnosticar, em fase inicial, possíveis lesões bucais permitindo o acompanhamento e o diagnóstico precoce. A coleta de dados foi realizada em novembro de 2014, sendo de participação voluntária. Para a realização do questionário foi necessário o auxílio da enfermeira responsável para responder às questões, devido às condições neurológicas da maioria dos idosos. Os resultados mostraram que o edentulismo é prevalente (57,7%), sendo que, dos 15 idosos edêntulos, 11 utilizavam próteses totais e 88,4% necessitam de prótese. As alterações de mucosa bucal mais prevalentes foram a flacidez dos tecidos, a língua saburrosa, as varicosidades linguais e a candidíase. Após a análise dos dados coletados, ficou evidente a necessidade de uma melhor atenção na saúde bucal dos idosos residentes do asilo. Cabe ressaltar que o

o cirurgião dentista tem papel fundamental na detecção de qualquer anormalidade que o idoso apresenta na cavidade bucal.