

FATORES QUE INFLUENCIAM NO DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E A IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE (APOIO SANTANDER)

Alunas: Gabriela Augusta Tavares e Vitória Presti Loro

Orientadora: Profa. Dra. Aline Ferreira de Oliveira Pereira

Curso: Biomedicina

Campus: São José do Rio Pardo

O papilomavírus humano (HPV) é responsável por causar a infecção sexualmente transmissível mais frequentemente diagnosticada e representa importante e gravíssimo problema de saúde pública, por ser o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo uterino, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde). O câncer se manifesta em mulheres de diferentes faixas etárias, como resultado de exposições repetidas à alguns subtipos do vírus. Nem sempre a infecção pelo HPV resulta no desenvolvimento de câncer; geralmente sua ocorrência e maior prevalência ocorrem em regiões de baixo nível socioeconômico, sendo locais de maior vulnerabilidade social, nos quais há deficiência de informações e falta de recursos para a realização do exame preventivo (Papanicolau). Fatores adicionais, como o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo e uso prolongado de anticoncepcionais também contribuem para o desenvolvimento da doença. Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar o nível de conhecimento da população local sobre o HPV e demais fatores que influenciam no desenvolvimento do câncer do colo do útero e a importância da adoção de medidas de prevenção e diagnóstico precoce. Para tanto, foi disponibilizado um questionário on-line, contendo perguntas sobre o tema proposto, direcionado ao público com 10 anos de idade ou mais, sem distinção de gênero. Até o momento, 80 pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade participaram da pesquisa, na qual obteve-se grau variado de conhecimento sobre o HPV e sua relação com o desenvolvimento de câncer de colo uterino.